

**TECHNOLOGIA LECZENIA MIEJSCOWEGO
SCHEMAT HIRUDOTERAPII WYBRANYCH CHORÓB**

Choroba	SCHEMAT LECZENIA MIEJSCOWEGO			
	Ilość seansów	Odstępy między seansami	Ilość pijawek na seans	Miejsce przystawienia
Choroba wieńcowa	3 do 6 w zależności od wieku (im osoba starsza, tym więcej seansów)	2 – 3 dni	6 do 10 sztuk	Na okolice serca (z przodu, z boku oraz z tyłu)
Zawał mięśnia sercowego				
Pozawałowe stwardnienie mięśnia sercowego				
Aktywny reumatyzm (z wadami serca)				
Niewydolność sercowo- naczyniowa				
Choroba niedokrwien serca				
Dwudzielna wada serca				
Stwardnienie płuc				
Zapalenie otrzewnej				
Zakrzepowe zapalenie żył	3 do 5 w zależności od zaawansowania choroby	5 – 7 dni	5 do 10 sztuk	Bezpośrednio nad żyłą z zakrzepem (unikając odcinków z cienką skórą i prześwitującymi sinymi żyłkami) lub wzdłuż naczynia krwionośnego, z obydwu stron w formie szachownicy, w odległości około 0,6 cm od żyły oraz 5 – 6 cm jedna pijawka od drugiej z każdej strony
Żylakowe zapalenie żył kończyn dolnych				
Zjawiska zastojowe w wątrobie oraz w woreczku żółciowym	1 do 2	5 – 7 dni	3 do 8 sztuk	Na obszar wątroby (prawa strona pod żebami)
Łuszczyca	4 do 6	5 – 7 dni	5 do 9 sztuk	Dookoła obszaru chorego miejsca lub nad naciekiem skórnym
Egzema				
Twardzina skóry (sklerodermia)				
Toksyczne zapalenie skóry				
Różyczka	4 do 6	5 – 7 dni	5 do 9 sztuk	Dookoła obszaru chorego miejsca lub nad naciekiem skórnym
Wysypka arsenowa				
Toczeń skóry (różne formy)				
Słoniowatość				

Choroba	SCHEMAT LECZENIA MIEJSCOWEGO			
	Ilość seansów	Odstępy między seansami	Ilość pijawek na seans	Miejsce przystawienia
Czyraki	1	-	3 do 5 sztuk	Na lub dookoła nacieku
Zastrzał kostny oraz palcowy (skórny, podskórny, okołokostny), wyprysk, ropień dłoni itp.	2 do 3	3 – 5 dni	3 do 8 sztuk	Na bolesne miejsca
Rwa kulszowa (zapalenie nerwu kulszowego, nerwobóle nerwu kulszowego)	4 do 8	5 – 7 dni	5 do 10 sztuk	Wzdłuż nerwu
Paraliże różnych nerwów	4 do 8	5 – 7 dni	5 do 10 sztuk	Wzdłuż porażonych nerwów
Zapalenie zatok	5 do 8	3 – 5 dni	3 do 5 sztuk	Nad komorami zatokowymi *
Ciężkie formy astmy oskrzelowej	4 do 6	5 – 7 dni	5 do 8 sztuk	Na obszar chorych miejsc
Zapalenie płuc z objawami niewydolności oddechowej				
Gruźlica płuc				
Gruźlica węzłów chłonnych				
Gruźlica kości				
Pooperacyjne zakrzepowe zapalenia	2 do 3	5 – 7 dni	6 do 10 sztuk	Okolice naczyń z zakrzepem
Hemoroidy	1 do 3	3 – 5 dni	4 do 7 sztuk	Bezpośrednio na zewnętrzny guzek krwawniczy lub dookoła odbytu przy guzkach wewnętrznych **
Wyrostek robaczkowy	4 do 6	5 – 7 dni	5 do 9 sztuk	Prawa pachwina
* lub na oba wyrostki sutkowe oraz na kąt żuchwy po obu stronach (aby uniknąć ewentualnych blizn na twarzy). W przypadku silnych oraz długotrwałych stanów zapalnych stosuje się na wszystkie wymienione obszary.				
** Ze względów higienicznych przed położeniem pijawek na zewnętrzny guzek krwawniczy lub wokół odbytu wskazane jest kilkakrotne płukanie jelita (lewatywa) do tzw. białej wody. W przeciwnym razie pijawki należy przyłożyć nad kość ogonową lub w miejsce nieco poniżej kości ogonowej.				